

# Tilleggsetikett Off-label

## Proline EC 250 - protiokonazol

Off-label godkjenningen er gitt til: Norsk Frøavlerlag, Midtbøvegen 52, 3803 BØ I TELEMARK

Godkjent av Mattilsynet: 27.01.2016

Gyldig t.o.m.: 30.06.2019

Etiketten er kun gyldig for brukere som har signert en erklæring om ansvarsforhold ved en off-label anvendelse av ovennevnte preparat.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

### Advarsel

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett

### Bruksområde

I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer

### Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

### Bruksrettledning

#### **Dosering:**

40 - 80 ml/daa

#### **Aktuelle behandlingstidspunkt**

Fra begynnende strekning av frøenga (BBCH 31) fram til blomstring (BBCH 65).

Behandling gjøres når en ser begynnende angrep.

Når det er fare for angrep av fusarium på frøet må det brukes en dose på 60 - 80 ml ved blomstring.

Tidlig behandling er mest aktuelt når det året før ble sett betydelig angre av sopp i frøenga. Ved bruk av minste dose tidlig i sesongen må en forvente kort virkningstid og behov for ny behandling, bruk i så fall Acanto Prima ved neste behandling.

Minste dose er også aktuelt når Acanto Prima er benyttet tidligere i sesongen

---

### **Off-label - Ansvar og regler**

En Off-label godkjenning gjør det mulig å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i et bruksområde som ikke står på preparatets ordinære etikett.

Tilleggsetiketten deles ut sammen med en erklæring om ansvarsforhold, og som skal signeres av den enkelte bruker.

Selv om bruksrettledningen følges kan det ikke garanteres for at det ikke vil oppstå skader på kulturen, eller at det kan være varierende virkning av preparatet. Bruksområdet som gjelder off-label anvendelsen bygger på få forsøksresultater og observasjoner, det kan derfor være forhold som gjør at preparatet kan gi utilsiktede virkninger i den/de aktuelle kulturen(e).

Det understrekes at brukeren alene bærer ansvar for eventuelle skader som følge av behandling med preparatet i de kulturer som er omfattet av tilleggsetiketten.