



Frønytt 11-2014

18. juni 2014

Innhold:

- [Markdag](#)
- [Nye frøpriser og vilkår](#)
- [Mekanisk bekjemping av høymole](#)
- [Luking av åkerdylle og åkertistel](#)
- [Soppsprøyting](#)

Markdag

Buskerud: Torsdag 26.juni kl. 18.00 hos Eldor Bjerke, Ask på Ringerike. Hovedtema rødkløver og timotei, om mulig også hvitkløver.

Nye frøpriser og vilkår

Norsk Frøavlerlag og frøforretningene har blitt enige om nye frøpriser og vilkår, de nye frøprisene finner du under frøavlerlagets nettside www.froavlerlaget.no Nettsiden er oppdatert med et nytt publiseringsverktøy slik at den nå er enklere å oppdatere med ny informasjon. På nettsiden finner du alle utgaver av Frønytt, håndboken, off-label med mere. Det vil bli lagt inn mer nyttig informasjon på siden også slik at vil være et aktuelt nettsted for frøavlerne.



Mekanisk bekjemping av høymole

Høymole sitter løst i bakken i rotlausvikua rundt St. Hans da plantene går over fra å tære på reservene til å lagre inn opplagsnæring i rota, eller etter regn. Ikke la slikt ugras frø seg. Ei høymoleplante kan ha opptil 10000 frø og de er veldig spiretrege, etter ca. 70 år i bakken er fortsatt 10-12 % av dem spiredyktige, matematikken greier dere sjøl.

Har kan du få skaffet deg et redskap kalt høymolestikke, den er fin å ta høymole med.

<http://okofunn.no/info-selges/redskap/hoymolespett/>
Bestill Høymolestikke på e-post: post@soreskogen.no



Luking av åkerdylle og åkertistel

Har en planter av åkerdylle eller åkertistel, er det tid for handluking. Når disse er i slutten av strekningsfasen sitter roten løst. Så det er mulig å få med hele roten når de blir dratt opp. En plante fjernet i år, har stor betydning på fremtidig frøbank. En plante kan produsere over flere tusen spiredyktig frø.

Soppsprøyting

Det er fremdeles aktuelt med soppsprøyting i timotei og engsvingel, soppbekjemping kan utføres inntil 5 uker før tresking. Det er aktuelt med bekjemping i alle fall fram til blomstring, kanskje litt lenger i timotei. Tidligere forsøk i engsvingel har vist ca. 10 % avlingsøkning for soppsprøyting. Spesielt i 2. års og eldre eng kan det være aktuelt å sprøyte med et soppmiddel dersom vekstforholdene tilsier det. I forsøk gjort på Hedmarken har en ikke fått noe effekt på avling med soppbekjemping. I Østfold har soppbekjemping gitt en meravling på inntil 15 % de siste årene. Aktuelle midler er Acanto Prima eller Stereo.

Vi forventer noe mindre soppangrep i tørt vær, men enkelte frøenger har nå fått noe legde. En er da mer utsatt for soppangrep, og soppsprøyting kan da være mer aktuelt.

Med hilsen fra:

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Sørøst
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving