



Frønytt 12-2014

27. juni 2014

Innhold:

- Sjekk spiring i gjenlegg uten dekkvekst
- Ugrasssprøyting i gjenlegg uten dekkvekst
- Når blir det tresketid?

På hele Sør- og Østlandet har det vært tørke, og mange frøenger lider. En jevnere fordeling av nedbøren over landet hadde vært ønskelig! Men vi får ta det vi får, litt har det kommet de siste dagene, så det hjelper i hvert fall.

Sjekk spiring i gjenlegg uten dekkvekst

I det siste har det vært noen spørsmål om hva man gjør med gjenlegg uten dekkvekst som spirer dårlig av ulike grunner. I de fleste tilfeller har det nok vært for tørt, og da er det spørsmål om frøet ligger uspirert eller om det er spirt og tørket bort etterpå. Dersom frøet ikke har startet spireprosessen er det mulig å rispe litt i overflata, men i de fleste tilfeller er nok omsåing det beste alternativet. Da må man i såfall ta hensyn til dagens dato og siste frist for såing av de ulike artene:

- Sauesvingel 15. juni
- Engrapp 20.juni (er man kjapp er det fremdeles mulig!)
- Strandør 1. juli
- Bladfaks 15. juli

Ugrasssprøyting i gjenlegg uten dekkvekst

Vi ønsker å minne om sjekk av ugrassituasjonen i gjenlegga, særlig der det ikke dekkvekst. Pass på at de ikke gror ned i ugras, store planter om høsten er utgangspunktet for en stor avling i førsteårsenga, da må det ikke få gro ned i ugras.

Bladfaks, engrapp, rødsvingel, sauesvingel og strandør legges normalt uten dekkvekst.

I bladfaks, engrapp, rødsvingel og sauesvingel kan det benyttes Hussar for bekjempelse av grasugras, først og fremst tunrapp og knereverumpe.

- I Bladfaks kan det benyttes inntil 10 ml Hussar OD + 40 ml Renol
- I Rødsvingel, 5 – 10 ml Hussar OD.
- I Sauesvingel inntil 5 ml Hussar OD.
- I Engrapp inntil 5 ml Hussar OD.

For de tre sistnevnte artene står det litt forskjellig med hensyn til bruk av Renol, men en kan bruke Renol i alle artene, en skal være sikker på at plantene er store nok ved sprøyting. De må ha minst 2,5 blad før de tåler behandlingen, det vil si at da er de største plantene noen større. Sauesvingel bør ha 5 blad før det benyttes Renol.

Sjekk hvor store plantene er før du sprøyter med Hussar, dersom det har kommet mye ugras og du er redd plantene kan være for små vil det være et alternativ å bruke 150-200 ml Ariane først for å slå ned det to-frøblada ugraset for at gjenlegget ikke skal få for stor konkurranse.

I strandør er det ikke så mange midler å velge mellom, i praksis bare Ariane S i en dose 200 – 250 ml/daa

Når blir det tresketid?

De forskjellige artene vi frøavler bruker ulik tid fra blomstring til moding. Dersom en følger med når enga blomstrer kan en få et godt anslag for når en kan forvente høsting. I tabellen under har vi satt opp noen tall vi har funnet for noen av artene.

Omtrentlig antall dager fra full blomstring til strenglegging, nedsviing eller direktehøsting:

Art	Strenglegging	Direktehøsting
Timotei	35	43
Flerårig raigras	33 (30-37)	40-45
Engsvingel	25	32
Rødsvingel	25	32-35
Hundegras	25-28	
Engrapp	25-33	35-40
Hvitkløver	23-28	
Rødkløver	30-35	42



Det er en frøskatt i enden av regnbuen!

Med hilsen fra:

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Sørøst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving