

**Innhold:**

- Ugrasbekjempelse
- Skadedyrbekjempelse
- Oppdaterte dyrkingsveiledninger

Etter en lengre godværsperiode der mye våronn er blitt unnagjort på Østlandet kom endelig regnet som det var behov for i både gjenlegg og frøenger.

## Ugrasbekjempelse

### Bekjempe flekker med ugras i frøenga

I mange frøenger er det tuster med ugras vi ikke ønsker å få med frø av i avlinga; timotei i rapp, alsike i hvitkløver og hundegras i engsvingel for eksempel. I engrapp vil det være lett å se timotei i enga nå, antakelig vil det også være lett å se hundegras i engsvingel nå også, mens en nok bør vente litt enda før alsikeplantene er lette å oppdage i hvitkløveren. Punktbehandling kan gjøres med en håndholdt «weedwiper». Den består av et rør hvor en fyller et ugrasmiddel og som samtidig er skaft, nederst er det en veke som fuktes av ugrasmidlet. Weedwiperen kan fåes i forskjellige arbeidsbredder, i alle fall fra ca 10 til ca 30 cm. Det finnes også noen typer hvor veken ikke er montert vinkelrett på skaftet. Så vidt vi vet finnes det noen weedwipere på lager hos FKA, de kan sikkert også skaffes fra andre plantevern- eller såfrøfirma.



I de fleste tilfellene vil en benytte glyfosat i weedwiperen, bruk da en del glyfosat og to deler vann. Dersom en ønsker å se hvor en har behandlet kan en tilsette fargestoff, Basisblå (blå markeringsfarge), fargen er synlig i ca en halvtime etter den er påført plantene. I hvitkløver mot alsike kan det tenkes at Tomahawk/Spitfire/Starane 180 er bedre egnet middel, mest sannsynlig vil glyfosat fungere god nok der også.

### Bruk av Basagran

Etter forrige frønytt med fokus på ugraskamp har vi fått tilbakemelding på at det bør nevnes at Basagran SG er så dyrt og effekten såpass dårlig mot en del arter at man bør alltid vurdere om lusing kan være vel så billig og mer effektivt. Vær oppmerksom på at Basagran SG har god effekt på linbendel, vassarve og tunbalderbrå i tillegg til balderbrå (om den ikke er for stor), disse ugrasa bør en unngå frø av i kvitkløverfrøavlinga. Sjekk enga nøye før du bestemmer deg for hvilket tiltak du velger.

### Skadedyrbekjempelse

Etter at vi har hatt en så tidlig vår må en også være forberedt på noe tidligere skadedyrbekjemping, men det er stor forskjell i utvikling forskjellige steder. Tidligere har det vært en tommelfingerregel at en sprøyter mot midd og timoteiflue når løvetann blomstrer i enga, ofte i perioden 17.-25.mai i de tidligste strøk. Det kan bli noe tidligere det blir i år, mye tidligere er vanskelig å si etter som det har vært ganske kalde netter den siste tida.

Vi minner også engsvingeldyrkerne og muligens også raigrasdyrkerne om å følge med i vårkornet og se om det blir næringsstikk av bladminerflue. Dersom en det blir en del av det så er det fare for angrep også i engsvingel og sikkert også raigras, altså et insektsprøytebehov også i første års eng-er.

## Oppdaterte dyrkingsveiledninger

Dyrkingsveiledninger for alle arter finnes på [www.froavl.no](http://www.froavl.no) og skal nå være oppdatert foran 2014-sesongen. Via denne siden er det også mulig å søke etter artikler i «Norsk frøavlsnytt» og Jord og plantekultur

---

### Med hilsen fra:

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Sørøst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving