

**Innhold:**

- Pussing av frodige gjenlegg
- Gjødsling av blasse gjenlegg
- Sopp-sprøyting i engrapp og rødsvingel
- Sprøyting med Boxer i rødsvingel

**Til alle frøavlere**

Det aller meste av frøet har nå kommet i hus, så det er viktig å følge med frøet som ligger på tørka. Minner samtidig om høstbehandling, som ble beskrevet i siste frønytt.

## Pussing av frodige gjenlegg

Flere frøavlere har kommet med spørsmål om de bør pusse på frodige gjenlegg av rødkløver og timotei. Vi har normalt ikke lagt vekt på pussing av disse artene om høsten og de har mange ganger stått veldig frodige om høsten uten at det har vært gjennomført noen pussing.

I Jord- og Plantekultur 2014 er gjengitt resultater fra gjenlegg til rødkløverfrø med forskjellig dekkvekst + med og uten pussing seint om høsten. Der konkluderes det med at både for tynne og for tykke gjenlegg er uheldig, derfor kan det være aktuelt å pusse ned spesielt tykke gjenlegg av rødkløver ved vekst avslutning. Da pusses plantene ned til 5 cm plantehøgde.

Frodig timotei kan pusses om høsten men det er ikke nødvendig, det bør gjøres i løpet av september, seinest første uke av oktober og ikke stubb lavere enn 5 cm.

Dere kan også lese mer om optimal høstbehandling i forskjellige arter i artikkelen fra «Norsk Frøavlsnytt»: <http://froavl.no/sok/PDF/2013/2/855.pdf>.

Gjenlegg av strandrør ikke må pusses sjøl om den har blitt veldig lang utover høsten, den har behov for opplagsnæringen for overvintringen. Den kan pusses til våren.

## Gjødsling av blasse gjenlegg

En del dyrkere opplever at gjenleggene er blasse (svært lyse), dette skyldes nok at det meste av næringen er brukt i løpet av den lange vekstsesongen. Her er det viktig å få ut gjødsel så raskt som mulig.

## Sopp-sprøyting i engrapp og rødsvingel

I dyrkingsveiledningen til Bioforsk anbefales sprøyting hvis det er over 5 % soppangrep, aktuelt middel er Acanto Prima (offlabel). Forsøk i engrapp har midlertid vist at bekjempelse på høsten har liten eller ingen effekt. Denne bør derfor bekjempes mellom begynnende strekningsvekst og skyting i engåra

## Sprøyting med Boxer

Boxer er et middel som kan brukes i raigras, rødsvingel og engrapp, det må ha minst gått 2 måneder fra såing og kulturplantene må minst ha et synlig sideskudd (BBCH 21-29). Kan også brukes etter tresking i frøårene, men primært i gjenleggsåret. God virkning mot nyspirt tunrapp, annet grasugras, rødvetann og vassarve.

**Med hilsen fra:**

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Sørøst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving