

**Innhold:**

- Høstbehandling – Grunnlag for neste år avling
- Fjerning av halm på dekkvekst
- Høstgjødsling før tresking av dekkvekst

Til alle frøavlere

Det meste av frøet er nå kommet i hus, det som ikke er tresket er rødkløver og litt engkvein. De siste ukers vær mye nedbør på øst og sør-landet, har satt en stopper for all tresking. Det hele toppet seg med ekstremværet «Petra» den siste uka. Men etter regn kommer det sol.

Høstbehandling - grunnlag for neste års avling

Gjødsling og pussing/slått av frøenga kan være avgjørende for en god frøavling neste år, ingen enger skal ha lang stubb stående vinteren over. Hvis det blir sein tresking av dekkvekst, kan det gjødsels før tresking. I forrige nummer av Frønytt ble arten timotei, engsvingel, rødsvingel og eng-rapp omtalt.

Engkvein

Fjern frøhalm (forsøk har vist 10-15% avlingsreduksjon ved bare å kutte frøhalmen) og puss ned lang stubb (ned til ca 5 cm) straks etter tresking. Ytterligere pussing er neppe nødvendig (det anlegges forsøk på Landvik nå for å undersøke dette nærmere). Høstgjødsling ca 1.september (eller straks etter tresking) med 2-6 kg N/daa, minst til Nor og mest til Leikvin, Leirin midt i mellom.

Strandrør

Høstgjødsling bør være gjennomført nå, dersom den ikke har fått gjødsel bør det gjøres så snart som mulig (ca 7 kg N/daa). Gjenveksten skal ikke pusses ned, strandrør har behov for å ta vare på opplagsnæring som er i de lange skuddene sjøl om gjenveksten kan bli betydelig.

Bladfaks

Puss ned stubb straks etter tresking og gjødsle med 4-5 kg N/daa i første halvdel av september. I begynnelsen av oktober er det aktuelt å pusse ned enga til 5-10 cm, det gjelder både gjenlegg og i frøåra. Bladfaks skal i motsetning til strandrør ikke ha lange skudd når den går inn i vinteren.

Hundegras

Hvis gjenveksten av hundegras er stor er det en fordel å pusse enga i begynnelsen av september. Hundegras skal ha 3-4 kg N på samme tidspunkt, uavhengig av gjenvekst.

Sauesvingel

I sauesvingel er det svært viktig at frøhalmen fjernes og enga pusses til 4-5 cm, det bør være gjort nå. 4-5 kg N gis ca 1. oktober. I gjenleggsårets er det sjelden behov for pussing, men gjenlegget bør få 4-7 kg N i løpet av høsten, gjerne fordelt på 2 tidspunkter.

Fjerning av halm fra dekkvekst

Mange gjenlegg med dekkvekst er ennå ikke tresket, hva gjør en med halmen fra dekkveksten? Er det svake/tynne gjenlegg er det fordel å få fjernet halmen etter tresking. Så gjenlegget får mest mulig lys og mindre konkurranse fra knust halm. Her må en vurdere om muligheten for å få fjernet halmen etter tresking på en skånsom måte, slik at en ikke kjører i stykke gjenlegget med ekstra trafikk.

Knuses Halmen pass på at en har skarpe kniver på halmkutteren og at halmen spres jevnt. Unngå å stopper med mye halm i treska, så det blir store halmdunger.

Puss ned halmstubben til 5-10 cm med halmknuser.

Gjødsle gjenlegget før tresking?

Mange har gjenlegg som ble sådd lovlig sent, hvor dekkveksten blir treskeklar i seneste laget. Dette kan gå ut over neste års avling, og vi anbefaler å gjødsle slike gjenlegg allerede før tresking, for å sikre et godt gjenlegg. Dette er viktigst i engsvingel og timotei, men vil også gjelde for de andre artene som såes med dekkvekst.

Med hilsen fra

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving SørØst
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving