

**Innhold:**

- Bor og Moddus i rødkløverfrøeng
- Sen bekjempelse av balderbrå i grasfrøeng
- Falske såbed
- Hvitkløverfrøsamling

De fleste steder har det nå kommet etterlengtet regn, som har gjort underverker med mange enger. Noen steder har det kommet i meste laget. Vi er nå klare for litt sol igjen. Vekstregulering bør være gjort eller planlagt i nærmeste fremtid.

Bor og Moddus i rødkløverfrøeng

Bruk av mikronæringsstoffet bor og vekstregulering med Moddus er anbefalt i rødkløverfrøeng. Stofrene bør ikke brukes som tankblanding, selv om de er blandbare i teorien. Grunnen er at den positive avlingseffekten blir mindre enn om man bruker dem hver for seg. Ved en feil ble det skrevet i siste Frønytt at disse bør blandes. Det er ingen katastrofe om så skulle skje, men man mister altså noe av den positive effekten. I Lea anbefaler vi å bruke Moddus først og så vente noen dager før en sprøyter bor, i sorten Yngve bør Moddus sprøytes ut seinere og da vil bor være mest aktuelt tidlig. Vi anbefaler bruk av Moddus og bor også i alle sorter, også tetraploide, selv om det er dårlig med positive avlingsresultater der. Moddus vil likevel redusere plantemassen og gjøre tresking enklere. Dose med Moddus er 100 ml/daa, med bor 150 ml Bortrac/daa.

Sen bekjempelse av balderbrå i grasfrøeng

Det har kommet noen spørsmål om muligheten for å bekjempe balderbrå i grasfrøeng nå, og det har vi god erfaring med i et enkelt forsøk i timotei for noen år siden. Midlet Primus viste seg å være skånsomt selv om det ble benyttet så seint som i overgangen mai - juni. Primus bekjemper stor balderbrå effektivt, midlet finnes hos Norgesfôrbutikkene og vi har fått bekreftet at Borgen-mølla i Stokke har det på lager. Vi har også fått spørsmål om mulighet for å blande midlet med vekstregulator, da er vi mer på tynn is og vi vil i alle fall være skeptisk til en slik blanding i timoteifrøeng hvor det vekstreguleres med Moddus og kanskje også usikkert med CCC. Helst bør en nok bruke Primus aleine i et slikt tilfelle. Dose Primus vil være 10-12 ml/daa.

Falske såbed


Husk å stille de falske såbedene i tiden fremover, og vurdere når det er egnet for såing. I dyrkingsveiledningene er det nevnt en anbefalt siste sådato. Husk at det er fullt mulig å så tidligere, dersom du er fornøyd med tilstanden til såbedet. Jo lengre utover sommeren vi kommer, jo vanskeligere er det å så med godt resultat. Såbedet blir hardere, slik at det blir vanskeligere å få ripet fure til frøet. I tillegg blir det ofte tørrere, noe som ofte resulterer i ujevn spiring og dårlige gjenlegg.

Hvitkløverfrøsamling

Det blir arrangert hvitkløverfrøsamling førstkommande mandag kl 14.00 på Sem, Tønsberg i en eng til Anders Fadum. Alle landets dyrkere er velkommen.

Tema vil være i hovedsak vurdere om det er behov for pussing, dessuten insektsprøyting (kløversnutebille)

Se kart henvisning: <http://kart.gulesider.no/m/66Cxu> (inn mot Meca)



Med hilsen fra:

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet