



Frønytt 8-2016

2. juni 2016

Innhold:

- Falskt såbed
- Siste frist for vekstregulering
- Sprøyting mot hvitaksmidd
- Kålmøll
- Obs pass på temperaturen ved sprøyting!

Varmen vi har fått de siste dagene setter fart i utviklingen på frøengene. Hyppig nedbør kombinert med frodige enger gjør at en må vurdere behovet for en ekstra vekstregulering samt soppbehandling.

Falskt såbed

Ved gjenlegg uten dekkvekst (med falskt såbed) er det viktig å gjøre ferdig såbedet tidlig, slik at ugraset rekker å spire frem før sprøyting og såing av gjenlegget. Falskt såbed er mest vanlig i engrapp, bladfaks, strandrør og rødsvingel.

Ved såing i det falske såbedet er det viktig å være nøye med å ha gode såforhold og sikre at frøet får god jordkontakt. Hvis såbedet skulle være for løst er det aktuelt med tromling før såing. Såbedet skal ligge minst 1 måned før såing av frøet, og beregn sprøyting med glyfosat 2 ganger. Aktuell dosering er 150-300 ml/daa der største mengde brukes mot tørkestressa, tofrøblada ugras. Det er anbefalt at det går ei uke fra siste sprøyting til såing om det ikke kommer nedbør i mellom, på grunn av fare for skade, men faren er nok ganske marginal.

Det bør ikke foretas noen ny jordarbeiding med mindre det er nødvendig på grunn av slemming, hardt såbed eller lignende. Dette kan det nok være noe av i år pga all nedbøren vi har hatt. I så fall kan en rispe i såbedet med ei ugrasharv eller lignende redskap.

Siste frist for såing av gjenlegg

I gjenlegg i falskt såbed bør det såes innen følgende datoer: Sauesvingel 15. juni, rødsvingel og engrapp 20. juni, bladfaks 15. juli og strandrør 1.juli.

Siste frist for vekstregulering i timotei og engsvingel

Nedbøren som har kommet den siste tiden har gjort at engene har blitt forholdsvis tette. Både engsvingel og timotei er nå i begynnende skyting, og det er nå tid for å vurdere en siste stråforkting. Vekstregulering etter skyting vil ha begrenset effekt. Skal en ut å stråforkorte nå, kan det være aktuelt å ta med et soppmiddel, men først og fremst i 2.års og eldre enger. Accanto Prima (80-150 g/daa), Stereo (70-150 ml/daa) og Proline (40-80 ml/daa) er alle aktuelle midler.

Sprøyting mot hvitaksmidd

I engrapp og rødsvingel er det fortsatt aktuelt å sprøyte mot hvitaksmidd dersom det ikke er gjort og en begynner å se skade av midden. Aktuelt middel og dose er Fastac, 30-40 ml/daa.

Kålmøll i frøengene

Det er nå registrert en betydelig forekomst av kålmøll i de fleste vekster, også i frøengene. Kålmøll gir kun skade i korsblomstra vekster. I frøengene er det derfor ikke aktuelt med noen bekjempelse.

Obs pass på temperaturen ved sprøyting!

En del midler kan få dårligere effekt, fordampe, ved høg temperatur, noen midler svir, dette kan gjelde alle typer midler, vekstregulatorer, ugrasmidler, soppmidler og insektmidler.

Les hva etiketten skriver og uansett unngå temperaturer over 24-25 grader, sprøyt enten så seint at det blir litt kjøligere utover, det kan være ganske seint, eller så tidlig at det blir flere timer før høg temperatur blir nådd.

Med hilsen fra:

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet