

**Innhold:**

- [Sviing av rødkløver](#)
- [Grasugrasbekjempelse](#)
- [Fjerning av halm fra dekkvekst](#)
- [Gjødsle gjenlegget før tresking?](#)
- [Tidspunkt for høsting av fôr i frøeng](#)

Sommeren har kommet tilbake i sørlige deler av landet. Dette fører til god vekt som de som har en fôrslått på høste etter frøhøsting. Vær oppmerksom på høstetidspunktets innvirkning på overvintring og frøavling året etter. Unngå kjøreskader!

Sviing av rødkløver

Nedsviing bør skje ca. 5 uker etter maksimal blomstring, men likevel ikke seinere enn ca. 15. september.

God uttresking av kløverfrøet krever at frømassen er tørr og at en kjører sakte. Om frøtap og kjørehastighet se Jord- og Plantekultur 2016 side 236. Tørt varmt vær, som vi har nå, gir de beste forhold for å berge avlinga, dersom været slår om før en har fått tresket må en ikke fristes til å treske under dårlige forhold, det vil bare føre til et stor frøtap.

Grasugrasbekjempelse**Ugrasbekjempelse i kløverfrøgjenlegg om høsten**

Tunrapp kan hemme kløverfrøgjenleggene betydelig, både i hvitkløver og rødkløver, slik at en bekjempelse er aktuelt. Norsk Frøavlerlag har en Off-labeltillatelse for bruk av Select + Renol om høsten i kløverfrøgjenlegg. Nødvendig etikett og skjema om ansvarsforhold finner du på <http://www.froavlerlaget.no/>. Bruk 40-50 ml Select + 40-50 ml Renol/daa etter høsting av dekkvekster. Dekkveksthalmene bør fjernes slik at en får god dekning av sprøytemidlet på tunrapp-plantene.

Atlantis om høsten i timoteigjenlegg

Norsk Frøavlerlag har en off-label godkjenning for bruk av Atlantis i gjenlegg til timoteifrøeng om høsten mot markrapp og annet grasugras. Se off-label her: <http://www.froavlerlaget.no/off-label-godkjenninger/>. I forsøk i 2008-2009, da det ble anlagt forsøk med Atlantis i gjenleggsåret, ble det oppnådd god effekt med 6,9 g/daa, uten at det gikk ut over avlinga. 13,9 g/daa ga bedre effekt mot grasugras, men førte til en liten avlingsreduksjon i forhold til usprøyta.

Puma Extra er aktuelt mot markrapp, timotei og noen andre grasugras i engsvingel- og raigrasfrøeng

I 2009 ble det gjennomført forsøk med bruk av Puma Extra mot grasugras i engsvingelfrøeng, et felt i gjenleggsåret og et felt i etablert frøeng. Om høsten i gjenleggsåret ble det sprøytet 14. september og i den etablerte enga ble det sprøytet 23. september. I begge felt ble det betydelig meravling for behandlingene med 100 ml Puma Extra/daa. Puma Extra har også noe effekt mot knereverumpe, men en kan ikke forvente like god effekt mot den som mot markrapp og timotei.

Ugrasbekjempelse i engrapp og rødsvingel om høsten

Boxer er tillatt brukt om høsten i gjenleggsåret i engrapp og rødsvingel. Effekten av en slik behandling er god på spirende ugras av tunrapp og knereverumpe, mens etablert ugras vil ikke bekjempes eller bekjempes dårlig. Mest effektivt vil en behandling være om gjenlegget pusses slik at det kommer lys til i bunnen som gir ny spiring av ugras.

I forsøk med bekjempelse av grasugras i engrapp med Hussar oppnådde en best resultat, det vil si ugrasbekjempelse og frøavling, ved å benytte Hussar to ganger i gjenleggsåret hvor siste sprøyting var 17. september, da ble det ikke benyttet Hussar i frøåret. I det samme forsøk var også Boxer med som høstsprøyting, men en oppnådde ikke bedre bekjempelse av tunrapp med denne behandling, likevel dersom forholdene for nyspiring av tunrapp er tilstede kan Boxer være aktuell. Se Jord- og Plantekultur 2016 side 178 - 183.

Fjerning av halm fra dekkvekst

Noen gjenlegg med dekkvekst er ennå ikke tresket, hva gjør en med halmen fra dekkveksten? Er det svake/tynne gjenlegg er det fordel å få fjernet halmen etter tresking. Så gjenlegget får mest mulig lys og mindre konkurranse fra knust halm. Her må en vurdere om muligheten for å få fjernet halmen etter tresking på en skånsom måte, slik at en ikke kjører i stykke gjenlegget med ekstra trafikk.

Knuses halmen, pass på at en har skarpe kniver på halmkutteren og at halmen spres jevnt. Unngå å stoppe med mye halm i treska, siden det da blir store halmdunger. Puss ned halmstubben til 5-10 cm med halmknuser.

Gjødsle gjenlegget før tresking?

Mange har gjenlegg som ble sådd sent, hvor dekkveksten blir treskeklar i seneste laget. Dette kan gå ut over neste års avling, og vi anbefaler å gjødsle slike gjenlegg allerede før tresking, for å sikre et godt gjenlegg. Dette er viktigst i engsvingel og timotei, men vil også gjelde for de andre artene som såes med dekkvekst.

Tidspunkt for høsting av fôr i frøeng

Høsting av fôr etter frøhøsting kan være aktuelt, særlig i år med fôrmangel. Tidspunktet for høsting er avgjørende for overvintring og frøavling neste år.

Timotei

Om fôrslåtten ble tatt 15. september eller 15. oktober ga ingen innvirkning på frøavlingen. En utsettelse av fôrslåtten fra 15. september til 15. oktober ga noe økt tørrstoffavling, men hadde negativ virkning på fôr kvaliteten. Det er svært viktig at en unngår kjøreskader ved en slik fôrslått. Sånn sett vil det være best å satse på en slått i siste halvdel av september. Høsting av gjenvekst uten at enga ble gjødslet etter frøtresking førte i forsøkene til redusert frøavling neste år (Jord- og Plantekultur 2016 side 240-245)

Engsvingel

Forsøk har vist at i områder med ustabil snødekke er engsvingelplantene utsatt for overvintringsskader hvis det isolerende laget av stubb og gjenvekst avpusses om høsten. I områder der snødekket er

mer stabilt, har avpussing om høsten mindre betydning, og det kan være aktuelt å ta en fôrslått. Det er viktig at en unngår kjøreskader, og derfor bør en ta sikte på å ta slåttene i første halvdel av september.

Hundegras

I hundegras kan det være aktuelt å ta en avpussing/fôrslått først i september. Senere avpussing kan føre til redusert frøavling året etter.

Nye frøpriser

Vedlagt til Frønytt er listen med nye frøpriser, de finnes også på Norsk Frøavlerlags nettside:

www.froavlerlaget.no

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag	959 04 768
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Stein Jørgensen	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	991 60 503