

**Innhold:**

- Pussing/slått av timoteifrøeng med stor gjenvekst om høsten?
- Bekjemping av alsike i hvitkløver om høsten
- Bekjemp grasugras i kløverfrøgjenlegg med Select om høsten
- Tid for å gjødsle engrappen

Høstværet har vært drivende i år, noe vi ser både av gjenvekt etter frøtresking men også med hensyn til sopppangrep. Viktig å følge med i frøengene også om høsten da er en bedre forberedt til neste frøsesong.

Pussing/slått av timoteifrøeng med stor**gjenvekst om høsten?**

I høst har det vært gode forhold for gjenveksten i timoteifrøengene, denne kraftige fellen vil skygge og hemme veksten neste år.

Normalt er det ikke nødvendig å pusse eller slå gjenvekst av timotei om høsten, dersom en på forhånd også har pusset ned stubben etter tresking kan høstslått føre til en ekstra tyning av opplagsnæringen i plantene og føre til redusert frøavling neste år slik en så i resultatene av forsøkene som ble høstet 2015 (se Jord- og Plantekultur 2016).

Forsøk gjennomført både i Norge og i Sverige viser litt forskjellige resultater av høstslått, vi må derfor gjøre en vurdering av forholdene i hver enkelt eng for seg.

Der gjenveksten er spesielt kraftig bør den pusses eller høstes. På dette tidspunktet kan det være risikabelt fordi plantene starter gjenvekst uten at de rekker å lagre ny opplagsnæring før vinteren og følgelig svekkes. Vi bør derfor gjennomføre pussing/slått i slutten av oktober hvor en kan forvente at det ikke blir ny gjenvekst. Ved pussing bør det stå igjen en stubb på ca 10 cm, altså ikke for lav stubbing.

Bekjemping av alsike i hvitkløver om høsten

I Litago har det vært vanskelig å skille alsikeplanter fra hvitkløverplantene om våren i frøåret. Bekjemping om høsten i gjenleggsåret kan være enklere, da er ofte hvitkløverplantene betydelig mindre i størrelse. Bildet viser en plante som ble punktbehandlet om høsten med en blanding av glyfosat og fluroksypur (Tomahawk eller tilsvarende) og hvor det om våren etter kun er igjen en åpen flekk der den vokste.

Det vil bli en samling i høst et eller annet sted for hvitkløverfrøavlere for å se på gjenlegg (i tillegg til den samlingen som er i dag hos Georg Solberg).

Fremdeles mulig med Select i kløvergjenlegg

Dersom det er mye tunrapp og annet grasugras i kløverfrøgjenleggene kan dette hemme kløveren, da vil det være fornuftig å benytte seg av Off-labelgodkjennelse



som Norsk Frøavlerlag har for sine medlemmer til å benytte Select om høsten. Der det er behov brukes 30-40 ml Select + 30-40 ml Renol/daa. Behandlingen er også effektiv mot timotei, markrapp og mye annet grasugras men ikke kveke.

Tid for å gjødsel engrappen

Gjenlegg og frøeng av engrapp skal gjødsles om høsten med 3-4 kg N/daa i gjenlegg og 4-5 kg N/daa i frøåret. Sjekk samtidig om det er behov for soppbekjemping, i så fall er Delaro et aktuelt middel, se tilleggsetikett som du finner på www.froavlerlaget.no.

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag	959 04 768
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Stein Jørgensen	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	991 60 503