



Innhold:

- [Markdag om frøtresking](#)
- [Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?](#)
- [Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst](#)

Vi har passert sommerens korteste natt og har stort sett gjort det som skal gjøres i frøenga. Vi håper enga ser lovende ut og at ventetida mot høsting blir positiv. Litt kan en også bruke ventetida til...

Luking

I frøengene er det ikke mye mer å gjøre nå, men luking av ugras eller fjerning av frøtopper av andre kulturgras bør gjøres der det er behov. En ser at det kan øke på med kulturgras etter hvert som en hatt flere runder med frø på et areal. Når ugrasfrøet får stått å drysse for hvert år det er frø på arealet så vil også problemet fort øke fra å være ubetydelig til å utgjøre et problem. Det kan være alsike i hvitkløver, timotei i engrapp, hundegras i engsvingel osv.

Gjenlegg skal en også følge med i, særlig er gjenleggene uten dekkvekst utfordrende å holde tilstrekkelig reine for ugras, regn med 2-3 ugrassprøytinger. Husk på at store planter i gjenleggsåret er viktig for å oppnå stor avling i første frøår.

Kultur	Ugras en bør/ kan luke
Engsvingel	Kveke, raigras, hundegras, høymole
Timotei	Høymole, balderbrå
Rødkløver	Høymole, balderbrå
Hvitkløver	Alsike, balderbrå, høymole, timotei, minneblom, stemor
Alle (glisne områder)	Floghavre, hønsehirse

Husk at ugraset kryper inn fra kantene og at mye er gjort hvis du går rundt åkeren og luker langs kantene, eller unngå å treske ytterste 0,5-1 m.

Selv om frøfirmaene kan rense ut flere av de nevnte ugrasartene vil rensing gi større avrens for å sikre tilfredsstillende rent frø.

For flere tips om ugras i din kultur:

[Dyrkingsveiledning alle kulturer](#)

Bilder: Tistel og balderbrå finner du lettest langs kanter. Foto: Harald Solberg



Markdag om frøtresking

Markdag om frøtresking er planlagt den 27. juli. Vi vil starte på formiddagen og avslutter med en praktisk del i ei frøeng. Så langt har vi ikke klart detaljer program. Det kommer seinere, og datoen kan også bli endret.

Forbered deg med litt mer lesestoff på [Frøavlerlaget](#)

Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?

I de forskjellige artene vi frødyrker går det forskjellig tid fra blomstring til tresking eller til skårlegging/nedsviing. Under har vi en tabell som gir en indikasjon på hvor lang tid det går, men været i modningstida er avgjørende, tabellen er ikke en fasit.

Art	Fra skyting til blomstring	Fra blomstring til:	
		Skårlegging	Direkte-tresking
Timotei	19	35	43
Flerårig raigras	15	33 (30-37)	40-45
Engsvingel	15	22-25	28-32
Rødsvingel	21	25	32-35
Hundegras	21	25-28	32-35
Engrapp	16	25-33	35-40
Engkvein		21(?)	
Hvitkløver		23-28 (nedsviing)	
Rødkløver		30-35 (nedsviing)	42-50

I kløverartene kan en ikke kun se på hvilken dag det er maksimal blomstring det må samtidig være godt vær for de pollinerende insektene, vi skal altså ha tilstrekkelig tørt og varm vær den dagen som vi legger til grunn for beregningen.

I flerårig raigras må vi følge med i blomstringen ved å studere småaksene. Blomstringen starter ca midt på akset, og i småakset er det blomsteranleggene nederst som starter først. Det er normalt at blomstringen i raigras strekker seg over lang tid, men under ugunstige forhold, regn, kan den bli ekstra lang. Det vil i så fall føre til at vi får et problem med å bestemme tresketidspunkt. Dersom en velger å vente på de siste er utviklet og mo-

dent kan de første og største ha drysset. Vi har ikke erfaring med skårlegging i raigras i Norge men er raigraset svært mismodent kan det være et tema, i så fall må en bestemme seg før det mest modne drysser.

Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst

Der der er sådd uten dekkvekst er det viktig å passe på at en bekjemper ugras før det hemmer gjenlegget. Nedbøren som har kommet har sikkert gitt gode forhold for både gjenlegg og ugras nå. I gjenlegg hvor Hussar kan benyttes kan det være aktuelt å bekjempe noe ugras med andre midler før det er mulig å benytte Hussar, Ariane S eller Starane XL+MCPA vil i så fall være mest aktuelle, ikke la annet ugras ta overhånd i påvente av at gjenlegget er stort nok for Hussar. Det er viktig at graset er stort nok til å tåle Hussarbehandlingen, dvs ca 2 fullt utviklede blader.

NB: Vent med å gjødsle gjenlegg uten dekkvekst inntil første ugrassprøyting er gjort, da unngår en å gjødsle ugraset.

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag	959 04 768
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860