



Frønytt 14-2018

11.07.18

INNHold:

- [Vær og vekst](#)
- [Salg av frøhøy, forslag til kontrakt](#)
- [Grovfôravlning på høsten](#)
- [Måle vann% i frøet](#)
- [Rullering på tørka](#)
- [Slagerhastighet](#)
- [Ferieoversikt:](#)

Vær og vekst

Selv om vi fikk en liten regnskur tidligere i uka monnet det ikke stort. For mange frøprodusenter er det nok nesten en fordel at det bare fortsetter å være tørt fremover, med hensyn på høsteforholdene. Men her er det nok delte meninger!

For de som høster i disse dager bør man være obs på spillet og luftmengder. Mye smått frø kan gå ut fra treskeren bak, om du ikke er obs. Selv om frøet er smått kan det likevel ha god spireevne, så pass på å få inn alt.

Salg av frøhøy, forslag til kontrakt

Vi oppfordrer alle til å balle opp og eventuelt selge frøhøyet i år, pga formangel. Men husk på at hvis man tar av halmkutteren må du vite at halmen blir høstet fra arealet innen kort tid. Ellers kan det bli avlingstap påfølgende år. Vedlagt finner du forslag til kjøpskontrakt.

Grovfôravlning på høsten

Pga. grovfôrsituasjonen oppfordrer vi til å ta en etterslått: Det er greit å gjødsle på timotei for å ta ei grovfôravling også på 2. og 3. årseng. Verdien av grovfôret vil være større enn et mulig avlingstap. Mulig tap øker dersom en høstgjødsler flere år etter hverandre.

Det må gjødsels rett etter tresking, og vi anbefaler litt mer gjødsling enn standard, siden det blir lenger vekstetid enn vanlig.

Timotei: 5 kg N (20 kg Opti NS)

Raigras: 7 kg N (26 kg Opti NS)

Engsvingel: 5 kg N (20 kg Opti NS). Slåtten bør ikke gjøres seint og det må ikke stubbes for lavt, i områder med lite snødekke, da det kan føre til vinterskader.

Man kan også ta en etterslått på engrapp og rødsvingel, men de skal ikke gjødsles etter tresking.

Måle vann% i frøet

Frøhøsting er i gang og en del frø er kommet på tørka allerede, det skal tørkes ned til 12 % vann. Bruk av elektroniske målere av typen Wile og tilsvarende er ofte ikke så nøyaktige til frø, enkelte bruker tilsendt såvare som kontroll for kalibrering men denne såvaren endrer vanninnhold med luftfuktighet på lagringssted og gir ikke bedre resultater. For å kontrollere hvor tørt frøet er kan en tørke frøet ved 130 grader C i en time. De som har tilgang på vekter med avlesing på 1/100 eller 1/1000 gram klarer seg med en prøve på 5-10 gram. Bruker en brevvekt eller annen vekt med 1 grams avlesing er det praktisk å veie opp nøyaktig 100 g frø, etter tørking vil reduksjonen i vekt tilsvare vann %. Noen av NLR-rådgivingsenhetene har mulighet til å hjelpe med å måle vann % i frøet for medlemmer, si i fra på forhånd dersom du kommer innom med en frøprøve.

Rullering på tørka

Pass på å få god rullering og god luftgjennomstrømning på tørka, frøet er litt røre i toppsjiktet en lenger ned i massen, rullering er nødvendig for å få rask nedtørking.

Slagerhastighet

Vedlagt ligger tabell med anbefalte slagerhastigheter.

Norsk Frøavlerlags nettside

Nettsiden som Norsk Frøavlerlag har etablert er stedet hvor du kan finne avtalte frøpriser, Frønytt, og mye annen frøinformasjon. Adressen er: www.froavlerlaget.no

Norsk Frøavlerlag på Facebook

Facebook er et greit sted å utveksle ideer og erfaringer eller få beskjed om arrangementer, derfor har frøavlerlaget etablert en egen gruppe for frøavlerne. Gruppen er lukket men det er bare å be om å bli medlem så er du med.

Ferieoversikt:

	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32
Johan Ingar Øverland	x	x			
Silja Valand		x	x	x	
Trond Gunnarstorp		x	x	x	
Astrid Gissinger	x	x	x		
Harald Solberg			x	x	

Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860