

Kjøpskontrakt grovfôr

Kjøper: _____

Selger: _____

Sted: _____ Dato: _____

Pris pr ball kr _____

Areal, antall dekar daa _____

Gras art _____

Viktig ved omsetning av frøhalm

Unngå spredning av hønsehirse og floghavre! Frøavl av engsvingel, raigras og bladfaks krever floghavrefri jord, det betyr at maskiner som er inne på arealer med disse ugrasene ikke bør inn på frøarealer. Mange frøavlere er også såkornavlere, de har de samme kravene, og vil derfor være viktig også om det skal høstes på timotei eller andre arter.

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras og sprer seg raskt i deler av landet nå. En plante kan gi 20 000 frø, i forsøk betydelig høyer. Levetiden i jord er funnet opp til 13 år.

Fjern halm/høy så snart som mulig! Ukutta frøhalm må fjernes så snart som mulig etter tresking, i forsøk i timotei førte lang halm som ble liggende til 25 % avlingstap året etter. Sørg for rask fjerning av frøhalm.

Kjøring i frøenga bør gjøres i faste spor slik at minst mulig andel jorda pakkes, det må ikke kjøres på kryss og tvers for å press og pakke. Tunge maskiner setter spor og reduserer avlingen, disse utfordringene er større dersom jorda er våt.

Beskrivelse av rengjøringstiltak:

Selger

Kjøper