


INNHold:

- [Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?](#)
- [Falskt såbed](#)
- [Siste anbefalte sådato for de forskjellige artene](#)
- [Ugrassprøyting i grasgjenlegg](#)
 - [Engrapp, rødsvingel, sauesvingel, bladfaks, strandrør](#)
- [Treskerdag med HMS i Vestfold](#)

Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?

Engsvingel og timotei nærmer seg blomstring og disse kan ha maks blomstring i og over helgen, da kan vi begynne å regne på hvor lenge det er igjen til skårlegging eller høsting. Nødvendigvis vil det variere med været, men tabellen under er i alle fall et utgangspunkt.

I kløverartene kan en ikke kun se på hvilken dag det er maksimal blomstring det må samtidig være godt vær for de pollinerende insektene, vi skal altså ha tilstrekkelig tørt og varm vær den

dagen som vi legger til grunn for beregningen. I hvitkløver har det vært godt nok vær lenge!

Art	Fra skyting til blomstring	Fra blomstring til:	
		Skårlegging	Direkte-tresking
Timotei	19	35	43
Flerårig raigras	15	33 (30-37)	40-45
Engsvingel	15	22-25	28-32
Rødsvingel	21	25	32-35
Hundegras	21	25-28	32-35
Engrapp	16	25-33	35-40
Engkvein		21(?)	
Hvitkløver		23-28 (nedsviing)	
Rødkløver		30-35 (nedsviing)	42-50

I flerårig raigras må vi følge med i blomstringen ved å studere småaksene. Blomstringen starter ca midt på akset, og i småakset er det blomsteranleggene nederst som starter først. Det er normalt at blomstringen i raigras strekker seg over lang tid, men under ugunstige forhold, regn, kan den bli ekstra lang, i år er derimot forholdene tørre og varme og vil sikkert føre til en mer ensartet modning.

Falskt såbed

Denne metoden brukes der frøenga etableres uten dekkvekst. Det spirte ugraset bekjempes med Roundup, noen dager før såing. Flott å kunne bekjempe tunrapp, markrapp og andre grasugas, samt uønska kulturgras. Deretter radsåes gjenlegget i ferdige såbedet. Har det kommet mye regn bør det i verste fall ripes opp med ei ugrasharv.

- Tunrapp 150ml
- Store tofrøblada ugras 3-400ml/daa

Det kan være vanskelig å få sådd så tidlig som tenkt nå som vi har hatt så mye nedbør. Det kan også ha blitt tilslammet i det falske såbedet, da kan det være grunn til å kjøre forsiktig med harv slik at en sikrer at såfrøet blir dekt av litt jord og kan spire raskt. Særlig hvis vi nærmer oss fristen for å så, da vil det være viktig at det spirer hurtig og blir store planter. Rødsvingel bør man få i gang fort, siden den ikke indusere blomsteranlegg før den har en viss alder.

Siste anbefalte sådato for de forskjellige artene

Art	Dato
Engrapp	10. juni
Rødsvingel	25.juni
Strandrør	25.juni
Hundegras	05.juli
Bladfaks	05. juli
Engsvingel	15.juli
Timotei	15. august

Ugrassprøyting i grasgjenlegg

I grasartene er 2-bladstadiet satt som tidligste tidspunkt for ugrassprøyting. Generelt er Ariane-S anbefalt i grasgjenlegg, den har brei ugrasvirkning og tar mange av de viktige ugrasene i grasgjenlegget. Starane XL kan være aktuell, men den har dårlig effekt mot meldestokk.

Dersom det benyttes Hussar OD i engrapp, rødsvingel, sauesvingel eller bladfaks skal de minste plantene i gjenlegget ha nådd 2,5-3 blad og plantene skal være normalt store. Hussar OD brukes på off-label etikett og det er viktig å velge dose og bruk av olje. Dere finner off-labeletikettene [her](#).

Engrapp

Ugrassprøyting: Hvis bare tofrøblada ugras: Ariane S, 200-250 ml/daa. Hvis problemer med tunrapp, knereverumpe, markrapp eller myrrapp sprøytes med Hussar OD (5 ml/daa pluss Renol et. Mero olje). Gjenta behandlinga hvis nytt grasugas spirer etter 4-6 uker. Hvis engrappen har minst 5 blad

og god jord-fuktighet kan Hussar OD byttes ut med Boxer (100-150 ml/daa) ved andre sprøyting, men som regel vil det heller lønne seg å ta en ny runde m/Hussar OD.

Rødsvingel

Ugrasbekjemping:

Hovedsakelig tofrøblada ugras på frøplantestadiet: Ariane S, 200-250 ml/daa. Både tofrøblada ugras og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5-10 ml/daa + Renol eller Mero olje (50 ml/daa). Rødsvingel skal ha 2-3 blad og være 2-3 cm høy ved sprøyting.

Sauesvingel

Ugrasbekjemping:

Hovedsakelig tofrøblada ugras på frøplantestadiet: Ariane S, 200-250 ml/daa. Både tofrøblada ugras og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5 ml/daa uten olje. Behandlinga gjentas om nødvendig etter 3-6 uker når nytt grasugras spirer.

Bladfaks

Ca en måned etter såing bekjempes både tofrøblada ugras og tunrapp/knereverumpe på frøplantestadiet: Hussar OD, 5 ml/daa uten olje. Behandlinga gjentas om nødvendig etter 3-6 uker når nytt grasugras spirer.

Strandrør

2-3 uker etter såing på 2-bladstadiet bekjempes tofrøblada ugras med Ariane S (200-250 ml/daa) eller Starane XL/Cleave (80-100 ml/daa). Uønska grasarter bekjempes på seinsommeren med punktsprøyting

Treskerdag med HMS

Tirsdag 2. juli hos Torbjørn Olsen, Rørkollgrenda 120, 3160 Stokke

Kornsatsing i Vestfold inviterer til spennende treskerdag.

Det blir flere treskere utstilt!

Program:

14.00 Teknisk gjennomgang av treskerens komponenter.

Innstilling og bruk for å høste og ivareta kvaliteten på kornet/frøet.

V/Bjørn Tønsberg

15.30 Bruk og innstilling av tresker ved høsting av oljevekster og frø v/Åge Bergan,
Bergan Maskinsalg

16.15 Mat fra grillen.

17.15 HMS i en travel tid ved innhøsting. v/Knut Olav Omholt, NLR Viken

Avslutning senest kl 19.00.

Vell møtt!

For spørsmål eller mer info kontakt:

Prosjektleder Oddbjørn Rød

Mobil 920 39 093 el

oddbjorn.rod@bondelaget.no

Alle Frønytt finner du også på <https://kornforum.nlr.no/fagartikler/froenytt->

Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Viken	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Nils Kristian Aker	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	452 44 182
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860