

**INNHold:**

- Vekstregulering og borgjødsling i rødkløver
- Insektbekjempelse i 2. års rødkløverfrøeng
- Sprøyting mot kveke i rødkløver og rødsvingel
- Vekstregulering i timotei

Rikelig med nedbør de siste ukene har gjort godt for frøengene. Utviklinga går nå raskt!

Vekstregulering og borgjødsling i rødkløver

Rødkløver bør vekstreguleres med 100 ml Moddus M pr daa og det bør bladgjødsles med bor, 150 ml Bortrac pr daa, men disse midlene bør ikke blandes. Blandes Moddus M og Bortrac mister en mye av den positive effekten på frøavlinga. Vekstregulering utføres ved begynnende strekning (det er nå, sist i mai) i de fleste sortene bortsett fra i Yngve hvor det bør utføres noe seinere, ved begynnende knoppdanning. Borgjødsling skal også utføres innenfor samme tidsrom, begynnende strekning til begynnende knoppdanning, men altså ikke samtidig med vekstregulering. Altså bør borgjødsling utføres tidlig i Yngve og seint i de øvrige sortene.



Bildet er fra forsøksfelt i Råde med vekstregulering og forsommerpussing i rødkløver. Feltet ble pussa i forrige uke, og første vekstregulering ble utført denne uka.

Insektbekjempelse i 2. års rødkløverfrøeng

I år er det en del 2. års rødkløverenger som skal produsere frø ett år til. I disse engene er det svært viktig å bekjempe insekter, som kløversnutebille og kløvergnager. Snutebilla flyr inn i enga etter hvert som temperaturen kryper oppover, og vi kan se små gnag på bladene. Det vil ofte sammenfalle med knopp-stadiet. Det er da tid for bekjempelse, men ikke før. Bruk 40 ml Biscaya pr daa.

Sprøyting mot kveke i rødkløver og rødsvingel

Det er nå tid for å bekjempe kveke i rødkløver og rødsvingel. Sprøyting bør gjøres sent, dvs på kvekas 4-5 bladstadium. Aktuell midler er Agil/Zetrola (150 ml/daa) eller Focus Ultra (400-500 ml/daa).

Husk sprøytevask før sprøyting med Agil/Zetrola eller Focus Ultra!

Vekstregulering i timotei

Utviklinga går raskt, og timoteifrøengene er nå i strekkingsfasen. De fleste engene ser ut til å være i god vekst. Der en ikke har fått vekstregulert med CCC, er det nå mest aktuelt å bruke Moddus M eller Trimaxx. Anbefalt dose av disse midlene er 60 ml/daa. Tidspunktet for sprøyting med Moddus M / Trimaxx er mer fleksibelt enn for CCC, men den avlingsfremmende virkingen vil vanligvis avta med utsatt sprøytetid.

I frodige enger er Moddus M eller Triamaxx i dosen 30 ml/daa ved skyting svært aktuelt som et supplement til tidligere CCC-sprøyting.

Alle Frønytt finner du også på <https://www.froavlerlaget.no>

Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Viken	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Nils Kristian Aker	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	452 44 182
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860