

**INNHold:**

- Sjekk frøenga for sopp før vinteren
- Bekjemping av alsike i hvitkløver
- Avpussing i bladfaks
- Ta en sjekk av gjenleggene nå
- Bilder fra frøsesongen 2019

**Bekjemping av alsike i hvitkløver om høsten**

I Litago har det vært vanskelig å skille alsikeplanter fra hvitkløverplantene om våren i frøåret. Bekjemping om høsten i gjenleggsåret kan være enklere, da er ofte hvitkløverplantene betydelig mindre i størrelse. Bildet viser en plante som ble punktbehandlet om høsten med en blanding av glyfosat og fluroksypyr (Flurostar, Tomahawk eller tilsvarende) og hvor det om våren etter kun er igjen en åpen flekk der den vokste.

Fra dyrkingsveiledningen har vi hentet følgende om ugrasbekjempelse om ugrasbekjempelse:

Dersom problemet er høyvokste arter som timotei, kveke, høymole, burot og åkertistel, kan en annen løsning være å gå over frøenga med påstrykningsbom (wiper) med glyfosat. For ikke å skade kløveren bør denne påstrykinga utføres når det er størst mulig høydeforskjell mellom ugras og kløver, som regel i månedsskiftet mai-juni. For øvrig kommer vi sjelden utenom noe lusing i kvitkløverfrøenga.

Når det gjelder alsikekløver kan det være tryggest å gjøre en slik påstrykning nå mot slutten av veksten, da høydeforskjellen nå er tilfredsstillende mellom de to artene.

**Soppangrep nå på høsten**

Med lange netter, nattedogg og regnværsdager trives enkelte bladfeksopper. For noen arter kan det bety avlingstap, men for andre vil det bety mindre. For artene engrapp, rødsvingel og sauesvingel, samt for fjellfrø-arter er Delaro godkjent Off-label nå på høsten. For andre arter har vi ikke tilgjengelig middel.

Gå en tur i enga og sjekk status. Vurder 50-70 ml/daa av Delaro i nevnte arter, dersom angrepene er vesentlige.

**Avpussing i bladfaks**

Gjenveksten i bladfaksfrøenga varierer avhengig av tresketidspunktet, samt temperatur og nedbør om høsten, men i enkelte år kan vi få så mye bladmasse at det vil lønne seg å ta ei ny avpussing til 5 –

10 cm i oktober. Bladfaksen bør ikke gå vinteren i møte med stor bladmasse, og forsøk på avbrenning av daugras om våren har gitt katastrofale avlingsresultater.

### Ta en sjekk av gjenleggene nå

En del gjenlegg har vært hemmet av tykk dekkvekst som antakelig har gitt en god kornavling men hvor gjenlegget kan ha blitt for svakt. I tillegg har mange gjenlegg blitt høstet litt seint på grunn av en periode med stadig nedbør. Nå bør det være mulig å se om gjenlegget er liv laget, og er det nok med planter men små planter så kan det hjelpe i grasgjenlegg å gjødsle selv om det er litt seint.

### Billedkavalkade

Siden dette er siste melding i sesongen 2019 har vi hentet inn noen bilder fra sesongen. Det skjer mye innen fagområdet, som vi prøver å formidle via tekst gjennom sesongen. Her kommer noen bilder:



Foto: John Ingar Øverland, NLR Viken

- Shebourne i engsvingel
- Rødsvingel-legde
- Frøvandring i Telemark med Silja og Nils Kristian



Foto: Trond Gunnarstorp, NLR Øst

- Markvandring Trond Anstensrud

- Ulike strategier for avpussing og vekstregulering hos Per Oskar Ørmen, Råde. Pussing 23/5-2019



Foto: Harald Solberg

- Gode utsikter i timoteienga 4.6.

- Frøvandring hos Asbjørn Feiring, 5.6

Alle Frønytt finner du også på

<https://kornforum.nlr.no/fagartikler/froenytt-2019/>

Og på frøavlerlagets nettside <https://www.froavlerlaget.no>

Er du i tvil om frø – ta kontakt med din lokale frørådgiver.

Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Viken	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Nils Kristian Aker	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	452 44 182
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860