

**INNHold:**

- Vestfold Frøavlerlag og NLR Vikens markdag
- Buskerud Frøavlerlags markdag og årsmøte
- Høymole og rotlausuka
- Luking av andre kulturplanter i frøenga
- Vekstregulering, borgjødsling og grasugrasbekjemping i rødkløver
- Når blir det tresking i år?
- Ferieavvikling blant frøavlsrådgiverne

Vestfold Frøavlerlag og NLR Vikens markdag

Torsdag 25. juni kl. 18.00

Oppmøte hos Hans Olav og Elin Moskvil, Moskvilveien 20, Nykirke. Her ser vi på forsøksfeltet for Nitrogen-opptak i høsthvete, et gjenlegg til rødsvingel. Så forsetter vi videre til Hans Edvard Torp, Kopstadveien 305, Våle, hvor vi blant annet skal innom ei timoteifrøeng og det blir litt om nedsviing av kløver.

Her avslutter vi også kvelden med servering av jordbær og is!

[Se hele programmet på vår nettside.](#)

På grunn av smittesporing og beregning av servering ønsker vi at du melder seg på.

[Trykk her for å melde deg på.](#)

Buskerud Frøavlerlags markdag og årsmøte

Mandag 29. Juni 2020 KL. 18:00 Sandakerveien 422, 3519 Hønefoss hos Bernt Gran.

Vi kombinerer årsmøte med en markdag, og starter med en tur i Rødkløverfrøenga hos verten sammen med Nils Kristian Aker, NLR Østafjells.


Etter det faglige, får vi en innføring i Bernts spennende prosjekt, Gran Spiritus AS

Enkel servering før vi går over til årsmøte 2019. Ta gjerne med en campingstol

Høymole og rotlausuka

I frøeng er høymole et ondartet ugras som det tåles lite av i frøavlinga. Vi ser aldri så store mengder i eng frøeng at sprøyting er aktuelt, lusing er det rette tiltaket og tidspunktet er nå, «rotlausuka». På dette tidspunktet sitter rota relativt løst i bakken.

Unge høymoleplanter (1-2 år gamle) har minst opplagsnæring i rot på stadium «stor rosett». Eldre planter har minst opplagsnæring i rot ved stengelstrekking («rotlausuka»). En velutviklet høymoleplante kan ha rot som går mer enn en meter ned i bakken. Det er imidlertid de øverste 5 cm av rota som har evne til å sette skudd, så ved lusing er det disse 5 cm det er vesentlig å få med. Ved fuktigere forhold slipper rota lettere. Illustrasjonen til høyre viser hvordan rota på høymola utvikler seg over tid, i frøeng må den ikke få utvikle seg.



Lusing av andre kulturplanter i frøenga

Nå er det også lett finne og luke noen andre arter som kan være vanskelig å rense ut av frøavlinga, det gjelder blant annet hundegras i engsvingel og timotei i engrapp. Som Bildet viser så er det ikke vanskelig å se hundegraset i engsvingelen.



Vekstregulering, borgjødsling og grasugrasbekjemping i rødkløver

Det er ikke for seint for å få god effekt av vekstregulering og borgjødsling i rødkløver dersom det ikke allerede er utført.

Rødkløver bør vekstreguleres med 100 ml Moddus M pr daa

Bor tilføres bladgjødsling med 150 ml Bortrac eller Mangan 500 Lebosol pr daa. Denne behandlingen bør ikke blandes med Moddus, da vil mye av den positive effekten tapes.



Når blir det tresking i år?

Vi ser engsvingelen er i begynnende blomstring nå, engrapp og hundegras er stort sett ferdige, da kan vi gjøre de første overslagene på når tresking kommer.

Bruker vi tabellen under kan vi beregne omtrentlig når vi må være tilbake fra ferie for å treske frøet før det drysser 😊

Med begynnende blomstring i engsvingel nå (19.juni) kan vi regne med direktetresking ca 19. juli (jeg håper det blir litt kjøligere slik at det trekker litt mer ut)

Tabellen under viser hvor lang tid en regner det går fra blomstring til tresking, men været i modningstida er avgjørende, tabellen er ikke en fasit.

Art	Fra skyting til blomstring	Fra blomstring til:	
		Skårlegging	Direktetresking
Timotei	19	35	43
Flerårig raigras	15	33 (30-37)	40-45
Engsvingel	15	22-25	28-32
Rødsvingel	21	25	32-35
Hundegras	21	25-28	32-35
Engrapp	16	25-33	35-40
Engkvein		21(?)	
Hvitkløver		23-28 (nedsviing)	
Rødkløver		30-35 (nedsviing)	42-50

I kløverartene kan en ikke kun se på hvilken dag det er maksimal blomstring det må samtidig være godt vær for de pollinerende insektene, vi skal altså ha tilstrekkelig tørt og varm vær den dagen som vi legger til grunn for beregningen. I hvitkløver har det vært godt nok vær lenge!

I flerårig raigras må vi følge med i blomstringen ved å studere småaksene. Blomstringen starter ca midt på akset, og i småakset er det blomsteranleggene nederst som starter først. Det er normalt at blomstringen i raigras strekker seg over lang tid, men under ugunstige forhold, regn, kan den bli ekstra lang, i år er derimot forholdene tørre og varme og vil

sikkert føre til en mer ensartet modning.

Ferieavvikling blant frøavlserådgiverne

Uke	27	28	29	30	31	32	33
Dato	29/6-5/7	6/7-12/7	13/7-19/7	20/7-26/7	27/7-2/8	3/8-9/8	10/8-16/8
Astrid Gissinger			X	X	X		
Silja Valand		X	X	X			
John Ingar Øverland	X	X	X				
Trond Gunnarstorp			X	X	X		
Harald Solberg					X	X	X

Alle Frønytt finner du også på frøavlerlagets nettside <https://www.froavlerlaget.no>

Er du i tvil om frø – ta kontakt med din lokale frørådgiver.

Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Viken	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860