

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51
Delaro SC 325 – protiokonazol + trifloksystrobin

Godkjent av Mattilsynet: 09.12.2022

Gyldig t.o.m. : Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til godkjenningsperioden for Delaro SC 325 utløper.

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann (se Bruksvilkår for å beskytte miljøet).

Bruksområde og virkeområde:

I frøeng av rødkløver mot kløverskålsopp, kløverbrann, kløverrust og andre bladsjukdommer.

Antall behandlinger:

Maks en behandling pr år.

Dosering:

50-100 ml/daa

Bruksrettledning

Ved soppangrep på mer enn 10 % av rødkløverens bladareal (unntatt blader på nederste leddknote) ved maksimal blomstring i slutten av juli eller begynnelsen av august. Best effekt ved tidlig sprøyting, men kan brukes inntil tre uker før forventet frøhøsting.

Påføring:

Åkersprøyte.

Bruksvilkår for å beskytte miljøet

For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen.

Bruksområde	Avdriftsreduksjon			
	0 %	≥50 %	≥75 %	≥90 %
Frøeng av rødkløver	10 m	5 m	3 m	3 m

Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

For øvrig gjelder godkjenningsbetingelsene som framgår av ordinær godkjent etikett.